http://hompy.sayclub.com/doll004
세이클럽]]아름다운

中药鉴定技术

第四章：叶类

http://nompy.sayclub.com/dom1004
세이클럽]]아름다운

目标药材

枇杷叶 、大青叶、番泻叶 * 、

http://nompy.sayclub.com/doll004
세이클럽]아름다운

枇杷叶

【来源】本品为蔷薇科植物枇杷 *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. 的干燥叶。

【产地】栽培。华东、中南、西南及陕西、甘肃均产，广东及江苏产量较大。

【采收加工】全年均可采收，晒至七、八成干时，扎成小把，再晒干。

【性状鉴别】

呈长圆形或倒卵形，长 12 ~ 30cm ，宽 4 ~ 9cm 。

先端尖，基部楔形，边缘有疏锯齿，近基部全缘。

上表面灰绿色、黄棕色或红棕色，较光滑；

下表面密被黄色绒毛，主脉于下表面显著突起，侧脉羽状；

叶柄极短，被棕黄色绒毛。

革质而脆，易折断。

气微，味微苦。

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
MC 9030
浙江宁海标尺厂

http://hompy.sayclub.com/doll1004
세이클럽 아름다운

杷叶背面锈毛密，羽状网纹叶革质，
长倒卵形易破碎，清肺止咳降胃逆。

【性味与归经】 苦，微寒。归肺、胃经。

【功能与主治】 清肺止咳，降逆止呕。用于肺热咳嗽，气逆喘急，胃热呕逆，烦热口渴。

【用法与用量】 6 ～ 9g 。

http://hompy.sayclub.com/doll004
세이클럽]아름다운

大青叶

【来源】本品为十字花科植物菘蓝 *Isatis indigotica* Fort. 的干燥叶。

【产地】栽培。主产于河北、陕西、江苏、安徽等省。

【采收加工】夏、秋二季分 2 ~ 3 次采收，除去杂质，晒干。

【性状鉴别】

多皱缩卷曲，有的破碎。完整叶片展平后呈长椭圆形至长圆状倒披针形，长 5 ~ 20cm ，宽 2 ~ 6cm ；

上表面暗灰绿色，有的可见色较深稍突起的小点；

先端钝，全缘或微波状，基部狭窄下延至叶柄呈翼状；

叶柄长 4 ~ 10cm ，淡棕黄色。

质脆。

气微，味微酸、苦、涩。

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

12
13
14
15
16
17
18

http://hompy.sayclub.com/doll1004
세이클럽아름다운

大青菘蓝叶基生，外表暗绿倒披针，
叶基狭窄柄合翼，凉血解毒消斑疹。

【性味与归经】 苦，寒。归心、胃经。

【功能与主治】 清热解毒，凉血消斑。用于温邪入营，高热神昏，发斑发疹，黄疸，热痢，痄腮，喉痹，丹毒，痈肿。

【用法与用量】 9 ～ 15g 。

http://hompy.sayclub.com/doll004
세이클럽]아름다운

番泻叶

【来源】本品为豆科植物狭叶番泻 *Cassia angustifolia* Vahl 或尖叶番泻 *C. acutifolia* Delile 的干燥小叶。

【产地】狭叶番泻主产于印度南部及埃及；尖叶番泻产于埃及。我国海南省及云南亦有栽培。

【采收加工】狭叶番泻在开花前摘下叶片，阴干后用水压机打包。尖叶番泻在 9 月间果实将成熟时，剪下枝条，摘取叶片晒干，按全叶与碎叶分别包装。

【性状鉴别】

狭叶番泻

呈长卵形或卵状披针形，长 1.5 ~ 5cm ，宽 0.4 ~ 2cm ，全缘，叶端急尖，叶基稍不对称。

上表面黄绿色，下表面浅黄绿色，无毛或近无毛，叶脉稍隆起。

革质。

气微弱而特异，味微苦，稍有黏性。

尖叶番泻　呈披针形或长卵形，略卷曲，叶端短尖或微突，叶基不对称，两面均有细短毛茸。

08.10.2006 09:21

http://hompy.saycLub.com/doll004
세이클럽]아름다운

番泻叶小卵披针，全缘基部不对称，
叶背灰绿被毛茸，泻热导滞通便神。

【性味与归经】　甘、苦，寒。归大肠经。

【功能与主治】　泻热行滞，通便，利水。用于热结积滞，便秘腹痛，水肿胀满。

【用法与用量】　2 ~ 6g ，入煎剂宜后下，或开水泡服。

【注意】　孕妇慎用。