

瓦楞子

Walengzi

ARCAE CONCHA

本品为蚶科动物毛蚶 *Arca subcrenata* Lischke、泥蚶 *Arca granosa* Linnaeus 或魁蚶 *Arca inflata* Reeve 的贝壳。秋、冬至次年春捕捞，洗净，置沸水中略煮，去肉，干燥。

【形态特征】

瓦楞子呈扇形或三角形，左右两壳相同或左壳稍大。背面隆起，有数十条直楞如瓦垄状，由顶端向周围放射，楞纹明显，由灰褐色和白色相间而成。壳内面乳白色，光滑，上端边缘有与肋纹相应的凹陷，而形成突出锯齿。质坚硬，能砸碎，断面白色。气无，味淡。以整齐，洁净、无残肉、无沙土者为佳。

【植物图片】



【产地分布】

毛蚶，生活于浅海泥沙底中，尤其喜在有溪水流入的河口附近，分布于我国沿海地区，以山东半岛的羊角沟，天津的塘沽，辽宁的辽河口等处为多。

泥蚶，生活于浅海软泥滩中，分布于我国沿海地区，山东、浙江、福建、广东等沿海地区皆有养殖。魁蚶，生活于浅海泥沙底中。分布于黄海、渤海、东海及南海等地区。

【性状】毛蚶：略呈三角形或扇形，长4~5cm，高3~4cm。壳外面隆起，有棕褐色茸毛或已脱落；壳顶突出，向内卷曲；自壳顶至腹面有延伸的放射肋30~34条。壳内面平滑，白色，壳缘有与壳外面直楞相对应的凹陷，铰合部具小齿1列。质坚。气微，味淡。

泥蚶：长2.5~4cm，高2~3cm。壳外面无棕褐色茸毛，放射肋18~21条，肋上有颗粒状突起。

魁蚶：长7~9cm，高6~8cm。壳外面放射肋42~48条



【炮制】秋、冬至次年春捕捞，洗净，置沸水中略煮，去肉，干燥。

【饮片】为不规则碎块或粉末。类白色、灰白色至灰黄色。较大碎块外表可见放射状肋线，有的可见棕褐色茸毛。气微，味淡。

【性味与归经】咸，平。归肺、胃、肝经。

【功能与主治】消痰化瘀，软坚散结，制酸止痛。用于顽痰胶结，黏稠难咯，癭瘤，瘰癧，癥瘕痞块，胃痛泛酸。

【用法与用量】9~15g，先煎。

【注意】对瓦楞子过敏者，无淤血痰积者，肝功能严重受损者禁用。

【贮藏】置干燥处。

